جَـامعة
المَـنارة
MANARA UNIVERSITY

3-2

Coetaneous Viral Infections

أخماج الجلد الفيروسية

- أهم الفيروسات التي يمكن أن تصيب الجلد :

1- فيروسات الحلأ الانساني Human Herpes Viruses

2- الفيروسات الجدرية Pox viruses

3- الفيروسات الحليمومية الانسانيةHuman Papilloma Viruses

فيروسات الحلأ

- الأنماط

الحلأ البسيط Herpes Simples

الحلأ النطاقي Varicella Zoster

الفيروس المضخم للخلايا Cytomygalovirus (CMV)

ابشتاين بار Epstein bar Virus

فيروسات الحلأ الانساني من النمط 6-7-8

الحلأ البسيط

- خمج أولي .
- خمج ثانوي (يحدث عند ثلث المصابين تقريباً ، نصفهم يحدث لديهم نكس مرتين سنوياً على الأقل)) .

ويقسم فيروس الحلأ البسيط لنوعين :Hsv 2 . Hsv 1

HSV 1

الخمج الاولي بـ HSV 1 يصيب الأطفال ، غيرعرضي أو تكون أعراضه صارخة ويسبب ألتهاب الفم الحلئي .

الخمج الثانوي بـ HSV 1 : يكمن الفيروس في عقدة عصبية قريبة غالبا عقدة غاسر ، يعاد تفعيل الإنتان بوجود ظروف مواتية لذلك (الطمث، الحمى، العلاج بال UVB، النقص المناعي ، نزلة البرد ، علاج بالستيروئيدات ، اورام)،على هيئة باقة من الحويصلات تظهر في أي مكان (غالباً على المخاطية الفموية أو التناسلية والتناسلية تنكس أكثر من الجلدية)

- ملاحظة : يحدث الخمج الثانوي سواء أكان البدئي عرضي أو غير عرضي .

©Dermnet.com

©Dermnet.com

HSV2

- الخمج البدئي : يصيب البالغين وينتقل جنسياً STD.

غير عرضي لدى الذكور غالباً وأعراضه صارخة لدى الإناث على شكل حويصلات سرعان ما تتمزق تاركةً ائتكالات مؤلمة على المنطقة التناسلية مع حس حرق .

الخمج الناكس : مثل HSV 1 . يكمن الفيروس بعقدة عصبية غالباً عقدة عجزية. و يحدث بظروف معينة ومواتية للنكس . يصيب المنطقة التناسلية و ماحول الشرج وقد تمتد للفخذين والإليتين على هيئة حرقة وحكة ولذع .

©Dermnet.com

©Dermnet.com

www.mshc.org.au

المعالجة

- الخمج الأولي : Acyclovir فموي 5 ملغ /كغ باليوم .
- الخمج الثانوي : الحالات الخفيفة يكتفى ببعض المجففات والمعقمات وبالخمج الشديد يعطى Acyclovir.

الخمج بفيروس الحلأ النطاقي

الخمج الأولي يدعى بالحماق (جدري الماء) : حضانة 14 يوم مع وهن وترفع حروري وتوعك عام ، بعدها يظهر الطفح على هيئة حطاطات صغيرة تتحوصل وتجف وتتغطى بقشور ثم تسقط .. يظهر الطفح على شكل أفواج مترافقة مع نوب الحمى لذلك نجد اندفاعات بأعمار مختلفة عند المريض بوقتٍ واحد .

العلاج : عرضي ، مجففات ، مضادات الهيستامين بوجود الحكة .

بالحالات الشديدة اسيكلوفير 800 ملغ 5 مرات / يوم .

©Dermnet.com

©Dermnet.com

الخمج بفيروس الحلأ النطاقي VZV

الخمج الثانوي : يدعى داء المنطقة أو ZONA .

يحدث بعد الإصابة البدئية بسنوات ويصيب الكبار أكثر من الصغار .

آلام حارقة تُتلى بعد أيام عدة بباقة من اندفاعات حويصلية على قاعدة حمامية وقد يتعكر محتوى الحويصلات وبعد أيام تجف وتتغطى بقشرة لا تلبث أن تسقط تاركةً ندبة .

ملاحظة : الإصابة تتركز في قطاع جلدي معين معصب بعصب واحد فتكون الإصابة أحادية الجانب لا تتجاوز الخط الناصف .

جَـامعة
المَـنارة
MANARA UNIVERSITY
©Dermnet.com

جامعة المنارة
https://manara.edu.sy/

©Dermnet.com

جامعة
المنارة
@Dermnet.com

اختلاطات داء المنطقة

- الأهم هو الألم بعد داء المنطقة حيث يبقى ألم شديد جداً بعد زوال الاندفاعات والشفاء ويستمر لعدة سنوات ويكون معند على المعالجة خاصة عند المسنين.
- علاج داء المنطقة : مطهرات ومجففات وبالطريق العام أسيكلوفير 800 ملغ 5 مرات / يوم مع مجموعة فيتامين Bحقن عضلي أو عن طريق الفم . بالإضافة للمسكنات القوية.

HPVالخمج بالفيروسات الحليمومية البشرية

تسبب هذه الفيروسات الثآليل
وتصنف بدورها الى :

1- ثآليل شائعة.

2- ثآليل مسطحة فتوية.

3- ئآليل أخمصية.

4- اللقمومات المؤنفة.

علاج الثآليل

- الكي البارد : آزوت بدرجة حرارة -190 مئوية.
- الثلج الفحمي : بدرجة حرارة -70 مئوية.
- التجريف : قليلة العدد.
- حالات الوسوف .

©Dermnet.com

©Dermnet.com

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

©Dermnet.com

©Dermnet.com

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY
©Dermnet.com

جَامعة المَنارة
MANARA UNIVERSITY
https://manara.edu.sy/

©Dermnet.com