

## جامعة المنارة

### كلية: الصيدلة

اسم المقرر: فيزياء طبية

رقم الجلسة (5)

عنوان الجلسة

حساب معامل لزوجة سائل بطريقة الكرة الساقطة



العام الدراسي 2024-2025

الفصل الدراسي الأول

## جدول المحتويات

### Contents

رقم الصفحة	العنوان
3	الغاية من الجلسة
3	مقدمة
4	الأجهزة والأدوات
5	تنفيذ التجربة
6	المراجع

## الغاية من الجلسة:

تطبيق طريقة الكرة الساقطة لحساب معامل لزوجة سائل الغليسيرين.

## مقدمة:

عندما يتحرك جسم ما في سائل لزج، فإن هذا الجسم يخضع لقوة احتكاك معاكسه لاتجاه حركته وبالتالي تخفض من سرعة حركته ضمن هذا السائل، تتعلق شدة هذه القوة بعدة عوامل من أهمها سرعة الجسم المتحرك وشكله الهندسي بالإضافة إلى الاحتكاك الداخلي للسائل اللزج، حيث أن قياس الاحتكاك الداخلي للسائل يعني ضمناً قياس الزوجة الديناميكية، أو ما يعرف بمعامل الزوجة  $\eta$  لهذا السائل.

تعطى قوة الاحتكاك المعاكس لحركة كرة كروية الشكل بنصف قطر  $r$  والمتحركة بسرعة  $v$  في سائل لزج عامل لزوجته  $\eta$ ، نسبة إلى قانون ستوكس بالعلاقة التالية:

$$F_1 = 6\pi \cdot \eta \cdot v \cdot r \quad (1)$$

عند سقوط الكرة بصورة عمودية في السائل، فإنها ستتحرك بعد فترة من الزمن بسرعة ثابتة  $v$ ، وسيكون هناك حالة توازن ما بين كل القوى المؤثرة على هذه الكرة.

هناك ثلاثة قوى رئيسية تؤثر على حركة وسرعة هذه الكرة ضمن السائل اللزج، وهي قوة الاحتكاك  $F_1$ ، وتكون باتجاه الأعلى كما هو موضح في الشكل (1)، وقوة الطفو الناتجة عن دافعة أرخميدس وهي أيضاً باتجاه الأعلى وتعطى بالعلاقة التالية:

$$F_2 = \frac{4\pi}{3} \cdot r^3 \cdot \rho_L \cdot g \quad (2)$$

أما القوة الثالثة المؤثرة فهي قوة الجاذبية المتجهة نحو داخل الجسم، وتعطى بالعلاقة التالية:

$$F_3 = \frac{4\pi}{3} \cdot r^3 \cdot \rho_S \cdot g \quad (3)$$


$\rho_L$ : كثافة السائل اللزج (*Liquid, L*).

$\rho_S$ : كثافة الكرة الساقطة في السائل اللزج (*Sphere, S*).

$g$ : تسارع الكرة الساقطة في السائل اللزج.

تصل الكرة الساقطة إلى سرعتها الحدية عندما تحقق القوى الثلاث السابقة العلاقة التالية:

$$F_1 + F_2 = F_3 \quad (4)$$



الشكل(1): القوى المؤثرة على كرة تتحرك ضمن سائل لزج

$$6\pi \cdot \eta \cdot v \cdot r + \frac{4\pi}{3} \cdot r^3 \cdot \rho_L \cdot g = \frac{4\pi}{3} \cdot r^3 \cdot \rho_S \cdot g \quad (5)$$

بحل هذه المعادلة نحصل على العلاقة الرياضية التي تتيح لنا إمكانية قياس معامل المزوجة:

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot r^2 \cdot \frac{(\rho_S - \rho_L) \cdot g}{v} \quad (6)$$

حيث يتم حساب السرعة (v) عن طريق قياس المسافة (L) والזמן (t) اللذين تقطعهما الكرة ضمن السائل، وبالتالي تصبح العلاقة السابقة بالشكل التالي:


$$\boxed{\eta = \frac{2}{9} \cdot r^2 \cdot \frac{(\rho_S - \rho_L) \cdot g \cdot t}{L}} \quad (7)$$

#### الأجهزة والأدوات (Apparatus):

1. مجموعة كرات من الفولاذ، أنصاف قطرها (0.2 – 0.3 mm).
2. 250 ml من سائل غليسيرين نسبة تقاوته 99%.
3. ميقاتيه لحساب زمن سقوط الكرة في السائل.
4. قاعدة معدنية على شكل حرف L.
5. حامل معدني بطول 100 cm.
6. حامل معدني بطول 25 cm.
7. قاعدة معدنية على شكل حرف L.
8. أنبوب زجاجي يوضع السائل لزج بداخله.
9. ملقط يثبت على الحامل المعدني ومزود بملقط على شكل فك لثبيت الأنابيب الزجاجي.
10. زوج من المغناطيسات أسطوانية الشكل لسحب المغناطيس من السائل كما هو موضح في الشكل (2).
11. أسلاك توصيل.

### تنفيذ التجربة (Carrying out the experiment)

- احسب باستخدام الدوارة اللولبية نصف قطر الكرة المعدنية المستخدمة في هذه التجربة.
- احسب أيضاً كتلة الكرة المعدنية باستخدام ميزان إلكتروني خاص، ومن ثم أحسب كثافة هذه الكرة  $\rho_S$ .
- احسب كتلة الغليسرين وذلك بوضع الأنبوب الزجاجي على الميزان الإلكتروني ومن ثم املأه بـ  $100\text{ ml}$  من الغليسرين، ومن ثم أحسب كثافة هذا السائل  $\rho_L$ .
- أملأ الأنبوب الزجاجي بسائل الغليسرين ببطء مع مراعاة عدم تشكل فقاعات في السائل، كونها تؤثر على زوجة السائل وسرعة الكرة المعدنية. في حال تشكل هذه الفقاعات، انتظر فترة من الزمن حتى تخفي هذه الفقاعات من السائل وتتابع التجربة.
- اضبط الميقاتية على الصفر.
- قم بإفلات الكرة المعدنية بالقرب من سطح السائل.
- قم بتشغيل الميقاتية حلماً تصل الكرة المعدنية إلى النقطة الأولى (تدرجها محددة على الأنبوب)، لأنها تكون بذلك قد بلغت سرعتها الحدية.
- عندما تصل الكرة إلى النقطة الأخيرة (تدرجها محددة على الأنبوب) قم بايقاف الميقاتية.
- اقرأ الزمن ( $t$ ) الذي احتاجته الكرة لقطع المسافة ( $S$ ) ما بين النقطتين (الدرجتين) السابقتين وسجله في الجدول (1).
- أعد الكرة المعدنية إلى نقطة التعليق وذلك باستخدام المغناطيس الأسطواني، كما هو مبين بالشكل التالي:



الشكل(2): إعادة الكرة المعدنية بواسطة المغناطيس إلى الموضع الابتدائي للتجربة.

- أعد ضبط الميقاتية على الصفر مرةً أخرى.
- أعد قياس الزمن ( $t$ )، كما في المرحلة السابقة، ثلاثة مرات.
- سجل نتائج القياس ومن ثم أحسب القيمة المتوسطة للزمن ( $\bar{t}$ ).
- احسب السرعة الحدية  $V$  لسقوط الكرة، ثم أحسب  $\bar{V}$ .
- احسب عامل زوجة سائل الغليسرين المستخدم في التجربة، وذلك باستخدام العلاقة (7).
- قارن القيمة التي حصلت عليها بالقيمة المرجعية ( $1.480\text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = \eta$ )، المقيسة في متوسط درجة حرارة يقدر بحوالي  $T = 20^\circ\text{C}$ . ماذا تستنتج؟

17. احسب الخطأ المطلق والنسبة المركبة في حساب قيمة عامل اللزوجة  $\eta$ .
18. احسب وبالطريقة اللوغاريتمية، الخطأ المركبة في الحساب.
19. عند زيادة درجة حرارة سائل الغليسيرين، هل تنخفض أم تزداد اللزوجة؟ ولماذا؟
20. علل وفاة الإنسان عند انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير جداً، ما هو المقصود بالموت بفعل التجمد؟

$L$ [cm]	$t$ [ms]	$V$ [cm · sec $^{-1}$ ]	$\eta$ [Pa · s]	$\bar{\eta}$ [Pa · s]	$\Delta\eta$ [Pa · s]	$\bar{\Delta\eta}$ [Pa · s]	$\bar{\Delta\eta}$ $\bar{\eta}$	$\bar{\Delta\eta}$ $\bar{\eta}$ %
50								

### المراجع (References)

1. Leybold, LD Physics Leaflets-**P1.8.3.1** (Assembling a falling-ball viscosimeter to determine the viscosity of viscous fluids).